

MEDICATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE MEDICAMENTOS

Antibiotics:

Ciprofloxacin: 1 tablet, 2 times per day

Ibuprofen: 1 tablet with food every 6 hours for 3 days then (after 3 days) 1 tablet with food every 6 hours as needed for pain

Hydrocodone (Norco): 1 tablet every 6 hours as needed for severe pain

Promethazine: 1 tablet every 6 hours as needed for nausea/vomiting

===

Espanol:

INSTRUCCIONES DE MEDICAMENTOS

Antibióticos:

Ciprofloxacina: 1 tableta, 2 veces al día

Ibuprofeno: 1 comprimido con comida cada 6 horas durante 3 días; luego (después de 3 días) 1 tableta con comida cada 6 horas según sea necesario para el dolor

Hydrocodone (Norco): 1 tableta cada 6 horas según sea necesario para el dolor intenso

Prometazina: 1 tableta cada 6 horas según sea necesario para las náuseas/vómitos

=====

MEDICATION INSTRUCTIONS / HƯỚNG DẪN THUỐC

Antibiotics:

Ciprofloxacin: 1 tablet, 2 times per day

Ibuprofen: 1 tablet with food every 6 hours for 3 days then (after 3 days) 1 tablet with food every 6 hours as needed for pain

Hydrocodone (Norco): 1 tablet every 6 hours as needed for severe pain

Promethazine: 1 tablet every 6 hours as needed for nausea/vomiting

===

Tiếng Việt:

HƯỚNG DẪN THUỐC

Thuốc kháng sinh:

Ciprofloxacin: 1 viên, 2 lần mỗi ngày

Ibuprofen: 1 viên với thức ăn mỗi 6 giờ trong 3 ngày; sau đó (sau 3 ngày) 1 viên với thức ăn mỗi 6 giờ để giảm đau nhẹ.

Hydrocodone (Norco): 1 viên mỗi 6 giờ khi cần đối với những cơn đau dữ dội.

Promethazine: 1 viên mỗi 6 giờ khi cần thiết để giảm buồn nôn / ói mửa.